

「京都茄子 (千両二号)」

コアオカスミカメ (幼虫)

害虫発生注意報!



登録農薬

- ・コルト顆粒水和剤
- ・スタークル顆粒水溶剤
- ・トレボン乳剤

等々…

注意!

ご使用前には、ラベルにて登録内容の確認をお願いいたします。

コアオカスミカメに、成長点部が吸汁加害にあうと、成長と共に被害部が拡大するので、葉に多数の穴が開いたり奇形になったりします。被害が激化すると芯止まりになり、その後の成長や収穫量に多大な影響を与えます。



幼虫の期間は、約 10 日間




約 0.4mm
縦横に放射線状の細刻
約 2.5 日で孵化 (約 30℃)
ヨトウガ等とは違い、1 個ずつ産卵します。



成熟まで約 23 日
(年間世代数は 4~5 世代)

1 頭の幼虫で、複数の果実・花蕾を食害し渡り歩くので、見つけたら捕殺しましょう。単純ですが、非常に効果的です。

その間、花蕾や果実に食入し甚大な被害を及ぼします!



その後、約 12 日間の蛹の期間を経て成虫へ…

登録農薬

- ・フェニックス顆粒水溶剤
- ・プレバソフフロアブル5
- ・ディアナSC
- ・アニキ乳剤
- ・アフーム乳剤
- ・プレオフロアブル

等々…

注意!

ご使用前には、ラベルにて登録内容の確認をお願いいたします。

「オオタバコガ」

- TAC information -

「京山科なす!」

ロンドンへ向け出発!!!



当 JA 自慢の京の伝統野菜「京山科なす」
7 月 18 日 イギリスのロンドンで開催される JA グループ京都主催の晩餐会でメニューに採用!
イギリスへ向け、無事出発しました!