

営農ウィークリーNEWS

みのり姫  の

4ヶ月ぶりの開催です!!

ふれあいマルシェ開催!



7月15日(木) 神足支店東側駐車場(ATM横)にて、『みのり姫のふれあいマルシェ』が開催されました。

新型コロナウイルス緊急事態宣言による影響で、今年3月に開催されて以来、4ヶ月ぶりの開催となります。

当日は、生産者16名が朝早くから、JA 京都中央の特産品である、京都茄子や京おくらを始め、京山科茄子や、万願寺とうがらし、伏見とうがらしなど、合

計996点の京都の夏を代表する野菜を納品・陳列されました。他にも、桃やトマト、きゅうり、九条ねぎ、大葉などの数多くの農産物が並び、オープン前から、新鮮な農産物を求める消費者で列ができていました。

今回のふれあいマルシェでは、農産物5点以上購入の方に、お漬物(きゅうり付け・トマトサラダドレッシング)の素をプレゼント。お買い上げいただいた消費者に、大変喜んでいただけました。

今後、新型コロナウイルス等の情勢を見ながら、月1回を目標に開催いたします。



—TAC information—



JA 京都中央 長岡京花菜部会 部会設立 30周年記念式典



7月15日(木) 乙訓支店にて、JA 京都中央 長岡京花菜部会 部会設立30周年記念式典が行われました。

平成2年に部会が設立され、同時に京の伝統野菜「花菜」のブランド産地として認証されました。部会員の弛まぬ努力と関係機関のサポートにより、30年という長きに渡り発展し続けて来られました。

今後も、さらに40年、50年と活躍されることを期待しています。

水稲栽培・水管理と追肥のポイント

令和3年6月 京都乙訓農業改良普及センター

◆穂肥の時期と量の判断の目安

基肥一発肥料は、イネの生育ステージに合わせて肥料成分が溶出するようにつくられているため、基肥一発肥料を施用した場合は、中間追肥や穂肥は原則必要ありません。

ただし、近年高温のため、肥料が想定より早く溶出し、必要な時期に肥料分が足りなくなることがあります。「施用量が少なかった」、「葉色が出ない…」といった場合は、下記の穂肥の時期と量の判断の目安を参考にさせていただくとともに、JAまたは普及センターにご相談ください。

〈参考〉基肥一発肥料 セラコート R ワン(40～60 kg/10a)
 LPSS コシ1号(40～50 kg/10a)
 すご稲(20～30 kg/10a)
 ハイ LP250 特3号(30～35 kg/10a)

①1回目の穂肥

…1穂の着粒数確保のために施用します。

着粒数が多すぎると、気象条件により白未熟粒などが発生しやすくなるため、茎数が多い(籾数も多くなる)場合は、やや控え目に施用します。

②2回目の穂肥

…粒の充実や粒張りを良くするために(定量を)施用します。

施用が遅れると、米粒中のタンパク質含有率が高くなり、食味が低下するため、遅れないように注意しましょう。

例) コシヒカリの場合

出穂20日前に葉色を確認(葉色の基準:葉色板の3.5)

◎ 葉色が基準どおり



・1回目穂肥(出穂18日前:幼穂1cm)でNK化成C6号を10kg/10a施用
 ・2回目穂肥(1回目穂肥の8日後)でNK化成C6号を10kg/10a施用

◎ 葉色が基準より濃い場合



・1回目穂肥の時期を5日程度遅らせる。
 ・または、施肥量を半分程度に減らす。

例) キヌヒカリの場合

出穂25日前に葉色を確認(葉色の基準:葉色板の4.5)

◎ 葉色が基準どおり



・1回目穂肥(出穂23日前:幼穂0.15cm)でNK化成C6号を10kg/10a施用
 ・2回目穂肥(1回目穂肥の10日後)NK化成C6号を10～15kg/10a施用

◎ 葉色が基準より濃い場合




・1回目穂肥の時期を5日程度遅らせる。
 ・または、施肥量を半分程度に減らす。

※ 幼穂の確認方法

● 平均的な株の一番育の
 高い茎を、根をつけた
 まま抜きとる。

● カッターで茎の
 まん中进行を切る。



幼穂