

営農ウィークリーNEWS

農福連携マッチング会開催 ～京おくら～



「京おくら」の栽培・出荷について説明する佐藤担当



袋詰め作業を体験する福祉事業所の皆さん

令和7年5月20日、経済部営農販売課の主催により、農福連携取組推進のマッチング会を本店で開催しました。京おくら生産者6名、福祉事業所5所、関係者含めて27名の参加がありました。


今回は、福祉事業所の職員を対象に、オクラの選別や袋詰め作業を体験してもらった後、各農家と意見交換を行ってもらいました。今後、各福祉事業所に対応可能な作業請負を検討してもらい、生産者と関係機関を含めて調整し、生産者の労働力不足解消に向けて取り組むこととしています。なお、農福連携につきましては、現在、京都市や京都府で補助事業が用意されており、必要経費の一部が補助されますので、取組やすくなっています。



—TAC information—

除草剤を効かすための水管理

■「除草剤散布後水田水がなくなるまで給水しない止水管理」の模式図



初中期一発処理剤は、土壌表面に薬剤処理層を形成させることがポイントです。

- ①水深5～6cmに湛水して除草剤を施用。
- ②薬剤処理後3～4日間は処理層を作るため湛水状態を保ちます。
- ③処理後7日間は自然減水とし、落水、かけ流しはしない。水がなくなっても除草剤の効果は十分にあることが確認されています。(日本調節剤研究会)
- ④凹凸のある水田では、粒剤施用が望ましい。

4 月下旬からの適度の降水と急激な高温で軟弱な生育になっている場合は、よく観察し、殺菌剤、殺虫剤の散布をお願いします。

○ネギさび病；ファンタジスタ水和剤、アミスター20フロアブル、メジャーフロアブル、アフェットフロアブル、パレード20フロアブルなど。

○野菜類アブラムシ；ウラドライフロアブル、モベントフロアブル、トランスフォームフロアブル、コルト顆粒水和剤、ベネビアODなど。

○今年は、すでにオオタバコガの食害も見られています。被害がひどい場合は、オオタバコガの薬剤も検討ください。

○農薬散布に当たっては、登録されている作物、倍率、使用時期（収穫前日数）、回数を確認してから行ってください。

京都府病虫害防除所発生予察情報

7 病 第 1 3 号
令和 7 年 5 月 2 1 日

関係各位

京都府病虫害防除所長
(公 印 省 略)

病虫害発生予察情報について

下記のとおり発表しましたので送付します。

病虫害発生予報第4号（6月）

予報の概要

作物名	病虫害名	予想発生量 ＜平年比（前年比）＞	作物名	病虫害名	予想発生量 ＜平年比（前年比）＞
イ ネ	葉いもち	やや多(並)	チ ャ	チャノキイロアザミウマ	山城：並(並)
	ニカメイチュウ (第1世代)	やや多(やや多)		カンザワハダニ	丹波：並(並)
	ヒメトビウンカ	並(並)		チャノミドリヒメヨコバイ	丹後：並(やや少)
ナ シ	縞葉枯病	並	クワシロカイガラムシ	山城：並(やや多)	丹波：並(やや少)
	ツマグロヨコバイ	少(少)		丹後：並(多)	山城：やや多(やや多)
	イネミズゾウムシ	並(やや多)		丹波：並(並)	丹後：多(やや多)
ブドウ	黒斑病	やや多(やや多)	果菜類	疫病・褐色腐敗病	並(並)
	黒星病	やや多(多)		べと病	やや多(やや多)
	ハダニ類	並(並)	キュウリ	斑点細菌病	やや多(やや多)
カ キ	うどんこ病	やや多		うどんこ病	並(並)
	うどんこ病	やや少(並)	ネ ギ	さび病	やや多(多)
	ハダニ類	やや少(並)		ネギハモグリバエ	やや少(並)
果樹全般	カメムシ類	やや多(やや多)		ネギアザミウマ	やや少(やや少)
チ ャ	炭疽病	山城：やや多(やや多)	野菜類	アブラムシ類と	やや多(多)
	もち病	丹波：多(やや多)		モザイク病	
	チャノコカクモンハマキ	丹後：並(やや少)	果菜類	ハダニ類	やや多(多)
チ ャ	チャノホソガ	山城：並(やや少)		アザミウマ類	やや少(やや少)
		丹波：並(並)	アブラナ 科野菜	コナガ	やや多
		丹後：並(並)			
チ ャ		山城：やや少(少)			
		丹波：やや多(多)			
		丹後：多(多)			
チ ャ		山城：少(少)			
		丹波：やや少(並)			
		丹後：やや少(並)			

※平年とは過去10年の平均である。